


# Antibiotica gebruik tijdens uw behandeling

PRAKTIJK VOOR  
MONDHYGIËNE



SCHONAUWEN

Boogmuur 41A

3991 RP Houten

(030) 6361223

[www.pvmschonauwen.nl](http://www.pvmschonauwen.nl)

[praktijk@frisgebit.nl](mailto:praktijk@frisgebit.nl)



## Antibiotica gebruik tijdens uw behandeling

Uw mondhygiënist kan een antibioticum inzetten ter ondersteuning van de behandeling van uw tandvlees. Als er van een bepaalde soort bacteriën teveel aanwezig zijn en de natuurlijke balans tussen “goede en slechte” bacteriën hersteld moet worden kan zij u adviseren om een kan een antibiotica te gebruiken.

Antibiotica kan de groei van deze bacterie stoppen zodat het lichaam de tijd krijgt om de afweer te reorganiseren, de ziekteverwekker te doden en deze op te ruimen. Er zijn tientallen antibiotica 's met ieder een eigen specifieke werking.

Uw mondhygiënist zal op basis van een kweekafname/kweekuitslag een advies uitbrengen over de te gebruiken antibiotica. (dit kan soms meerdere soorten tegelijk zijn). Afhankelijk van welke bacteriën er gevonden zijn.

## Het gebruik van antibiotica

- Antibiotica gebruiken heeft alleen zin als dat precies **volgens de voorschriften** gebeurt. Als de kuur voortijdig gestopt wordt of de tabletten onregelmatig en niet precies volgens voorgeschreven dosering worden ingenomen, bestaat er een grote kans dat niet alle bacteriën worden gedood en dat de infectie van het tandvlees blijft bestaan.
- Een ander risico van te vroeg stoppen is dat de bacterie **resistent (=on gevoelig)** kan worden voor dat antibioticum. Belangrijke oorzaken van resistentie zijn: onnodig en verkeerd gebruik van antibiotica. Het strikt opvolgen van de voorschriften helpt dan ook resistentie voorkomen. Als u het om welke reden ook niet lukt u aan de voorschriften te houden moet u dit altijd melden bij uw behandelaar.
- Net als andere geneesmiddelen kunnen antibiotica **bijwerkingen** hebben. Lees altijd even de bijsluiter van door. Neem als er ernstige bijwerkingen optreden of bij twijfel altijd contact op met uw tandarts en of huisarts en stop nooit op eigen initiatief de kuur.

## Soort antibioticum:

Uw mondhygiënist adviseert u de volgende antibiotica te gebruiken:

- **Metronidazol-kuur**
- **Combi kuur (Metronidazol + Amoxicilline)**
- **Overig; .....**

## Enkele belangrijke informatie:

- **Geen alcohol** te gebruiken tijdens de kuur! De werking van het antibioticum is hierdoor vele malen minder.
- Hoofdpijn, duizeligheid en oorsuizen.
- Amoxicilline is een breed spectrum antibioticum, deze kan een **overgevoeligsreactie** teweeg brengen.
- **Huiduitslag** in combinatie met jeuk (5%), u moet dan de inname staken en contact opnemen. **Diarree** (2%), overleg met arts, dunne ontlasting is gebruikelijk. Soms **Misselijkheid en braken**.
- Metronidazol kan een **metaalsmaak** veroorzaken, dit is geen probleem.
- De **werking van de anticonceptie**(pil) kan tijdelijk **vermindern**. Neem voorzorgmaatregelen als u zwangerschap wilt voorkomen. (zie ook de bijsluiter)
- Mocht u **allergisch** zijn voor een bepaalde soort antibioticum, geef dit dan tijdig door aan de mondhygiënist. Zij zal overleggen met de apotheek.
- Omdat mondhygiënist **niet zelfstandig bevoegd** zijn om recepten voor antibiotica uit te schrijven zal dit via de tandarts/ huisarts gaan.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze folder, dan kunt u contact met ons opnemen.